



Obst-Info Franken

- Erdbeeren und Beerenobst Nr. 12 vom 14.06.2024 -

Vegetationsentwicklung in frühen bis mittleren Lagen Frankens



Erdbeere (Malwina)



Johannisbeere (J. v. Tets)



Heidelbeere (Duke)



Himbeere (Glen Ample)

Erdbeeren: Ernte mittelspäter Sorten. **Strauchbeeren:** Erntebeginn früher Sorten zum Wochenende/Anfang kommender Woche. Ungefäher Vegetationsvorsprung zum Vorjahr: 4 bis 5 Tage.

Wettervorhersage

Heute und morgen überwiegend bewölkt mit vereinzelt Niederschlägen bei Werten bis 21 °C. Sonntag und Montag sonnig bei Höchsttemperaturen bis 25 °C. Ab Dienstag steigen die Temperaturen auf Werte knapp unterhalb der 30 °C – Grenze. Dazu steigt dann aber auch das Gewitterrisiko. Eventuell zeichnet sich für die zweite Wochenhälfte eine stabilere Hochdruckwetterlage ab.

Erdbeeren (Freiland)

Unkrautbekämpfung in Frigo-Neupflanzungen (vor der Blüte bzw. ohne Beerntung)

Herbizidanwendungen sind bei Beerntung nur vor der Blüte zulässig (Rückstände)!

Direkt nach dem Pflanzen: Naprop 450 / Colzamid (2 - 2,5 l/ha) + Flexidor (0,2 l/ha)
oder alternativ

nach dem Anwachsen: Betasana/Betosip (3 - 6 l/ha) + Spectrum (0,7 – 1,4 l/ha)

Gegen Gräser ist der Einsatz von Fusilade Max (1 l/ha) bzw. Select 240 SC (0,75 l/ha) in Tankmischung mit Actirob B bzw. Radiamix (1 l/ha) möglich.

Speziell gegen Kamille, Disteln und Kreuzkraut kann nach erfolgtem Auflauf ein Einsatz von Lontrel/Vivendi 100 (1,2 l/ha) erfolgen.

In Neupflanzungen ohne Beerntung sollten die Blütenstände entfernt werden.

Strauchbeeren (Freiland)

Himbeeren / Brombeeren

Die Ernte früher Sommer-Himbeersorten startet.

Bei Herbsthimbeeren überzählige Ruten herausschneiden. Pro Laufmeter sollten ca. 10 Ruten belassen werden.

In Brombeeranlagen sollten die neuen Ruten jetzt provisorisch hochgebunden und am Draht befestigt werden. Pro Stock lässt man 4 bis 6 Ruten stehen. Das endgültige Fixieren erfolgt erst nach Ernteende und dem Herausschneiden der alten Tragruten

Johannisbeeren / Stachelbeeren

Benötigte Neutriebe am Draht fixieren und die restlichen entfernen!

In Neuanlagen Leitriebe selektionieren und anheften. Seitliche Austriebe an den Leittrieben unterhalb des ersten Drahtes entfernen!

Zulassungen

Colzamid (Napropamid) hat eine Zulassung in Erdbeeren gegen einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen Kletten-Labkraut, in Erdbeeren im Freiland im Freiland erhalten.

Aufwand: 2,5 l/ha in 400 bis 600 l/ha Wasser. Max. 1 Anwendung. Voraufdauerherbizid.

Im Ertragsjahr: vor der Blüte oder nach der Ernte.

Im Jahr ohne Ertrag: nach dem Pflanzen

Riehl